



অতিরিক্ত পরিচালক	
উপপরিচালক, কৃষি কার্যক্রম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আত্মীয় আকরী
উপপরিচালক, প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর	আত্মীয় আকরী
অতিরিক্ত (সহ/উপ) পরিচালক (উদ্যান)/ কৃষি প্রকৌশলী	অতিরিক্ত / জরুরী ব্যবস্থা নিন/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন/ নিরীক্ষণ ও আলাপ করুন
প্রোগ্রামার/হিসাব শাখা-প্রশাসন সহকারী / ক্যাশিয়ার	
হিসাব	কৃষি সহকারী
অনিট	উদ্যান শাখা
আবস	কৃষি সহকারী
তারিখ	২৬/৩/২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়,

কুমিল্লা

www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০০০.০৬.০০২.২১.১১৭

তারিখ: ৬ চৈত্র ১৪২৯

২০ মার্চ ২০২০

বিষয়: ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্ক বার্তা

গত ১৮-২০ মার্চ ২০২০ তারিখ কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরসহ দেশের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে যা ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে অধিকাংশ ধান খোড় হতে ফুল ফোঁটা পর্যায়ের রয়েছে। তাই শুধুমাত্র ব্রি ধান৭৪ ছাড়া বাকি সকল ধানের জাত বিশেষ করে ব্রি ধান২৮ ও এর সমসাময়িক জাতসমূহের জমিতে ব্রি কুমিল্লা কর্তৃক প্রেরিত “ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্ক বার্তাটি” (সতর্ক বার্তা (পিডিএফ ফাইল), সতর্ক বার্তা (ওয়ার্ড ফাইল)) উপপরিচালকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা অঞ্চলের কুমিল্লা, বি বাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার প্রতিটি উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা ও সকল কৃষকের নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

২০-৩-২০২০

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

সিএসও

উপপরিচালক, কুমিল্লা/চাঁদপুর/ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ফোন: +8809610818080

ইমেইল: rafiqbri@yahoo.com

স্মারক নং- ৪৭৩ (৩৩)

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :-

- ১। উপজেলা কৃষি অফিসার----- (সকল) উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পত্রের মর্মানুযায়ী ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্ক বার্তাটি উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।
- ২। অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), অত্র কার্যালয়।
- ৩। জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, অত্র কার্যালয়।

তারিখঃ ২৯/০৩/২০২০খ্রিঃ

উপপরিচালক  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
ব্রাহ্মণবাড়িয়া



## বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা

### ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্ক বার্তা

১৮-২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরসহ দেশের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে যা ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে অধিকাংশ ধান খোড় হতে ফুল ফোঁটা পর্যায়ে রয়েছে। তাই শুধুমাত্র ব্রি ধান৭৪ ছাড়া বাকি সকল ধানের জাত বিশেষ করে ব্রি ধান২৮ ও এর সমসাময়িক জাতসমূহের জমিতে নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলোঃ

১। জমিতে পানি ধরে রাখুন

২। ট্রাইসাইক্লোজল গুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার প্রতি ১৬ লিটার পানিতে ১৩ গ্রাম ঔষধ ভালভাবে মিশিয়ে ৮ শতাংশ জমিতে মোট ২ বার বিকাল বেলা স্প্রে করুন।

১মবারঃ ধানের খোড় ফেটে শিষ বের হওয়ার সময়

২য় বারঃ ১ম স্প্রে করার ৭-১০ দিন পর অর্থাৎ পুরোপুরি খোড় হতে শিষ বের হওয়ার পর

অথবা এজোক্সিস্ট্রিবিন গুপের ছত্রাকনাশক যেমন: নাটিভো অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক (১০ গ্রাম ঔষধ ১৬ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ৮ শতক জমিতে) একইভাবে বিকাল বেলা দুই বার স্প্রে করতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে যেন স্প্রে করার পরপরই বৃষ্টিতে ঔষধ ধুয়ে না যায়। আর শিষ ব্লাস্ট একবার হয়ে গেলে আর দমন করা যায় না। তবে পাতা ব্লাস্ট হয়ে গেলে ট্রাইসাইক্লোজল গুপের ছত্রাকনাশক ৭-১০ দিন অন্তর অতিরিক্ত ২ বার স্প্রে করতে হবে।

সহযোগিতায়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।

প্রচারেঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা। ০১৭১২-৮৮৭৫০৭



## বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা

### ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনে জরুরী সতর্ক বার্তা

১৮-২০ মার্চ ২০২৩ তারিখ কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরসহ দেশের অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়েছে যা ধানের শিষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে অধিকাংশ ধান খোড় হতে ফুল ফোঁটা পর্যায়ে রয়েছে। তাই শুধুমাত্র ব্রি ধান৭৪ ছাড়া বাকি সকল ধানের জাত বিশেষ করে ব্রি ধান২৮ ও এর সমসাময়িক জাতসমূহের জমিতে নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলোঃ

১। জমিতে পানি ধরে রাখুন

২। ট্রাইসাইক্লোজল গুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার প্রতি ১৬ লিটার পানিতে ১৩ গ্রাম ঔষধ ভালভাবে মিশিয়ে ৮ শতাংশ জমিতে মোট ২ বার বিকাল বেলা স্প্রে করুন।

১মবারঃ ধানের খোড় ফেটে শিষ বের হওয়ার সময়

২য় বারঃ ১ম স্প্রে করার ৭-১০ দিন পর অর্থাৎ পুরোপুরি খোড় হতে শিষ বের হওয়ার পর

অথবা এজোক্সিস্ট্রিবিন গুপের ছত্রাকনাশক যেমন: নাটিভো অথবা অনুমোদিত ছত্রাকনাশক (১০ গ্রাম ঔষধ ১৬ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে ৮ শতক জমিতে) একইভাবে বিকাল বেলা দুই বার স্প্রে করতে হবে।

খেয়াল রাখতে হবে যেন স্প্রে করার পরপরই বৃষ্টিতে ঔষধ ধুয়ে না যায়। আর শিষ ব্লাস্ট একবার হয়ে গেলে আর দমন করা যায় না। তবে পাতা ব্লাস্ট হয়ে গেলে ট্রাইসাইক্লোজল গুপের ছত্রাকনাশক ৭-১০ দিন অন্তর অতিরিক্ত ২ বার স্প্রে করতে হবে।

সহযোগিতায়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা।

প্রচারেঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা। ০১৭১২-৮৮৭৫০৭